

**CONTRIBUIÇÃO**  
**AO CONHECIMENTO DOS OPHIDIOS DO BRASIL**

---

**V. Uma nova raça de *Bothrops neuwiedii***

POR

AFRANIO DO AMARAL

---

Ha dois annos, descrevi (1), sob o nome de *Bothrops neuwiedii meridionalis*, a subespecie da jararaca pintada que ocorre na região centro-septentrional da Argentina. Ficava, assim, elevado a 9 o numero de raças em que subdividi essa especie, sendo que as 8 primeiras, inclusive a *typica*, eu as havia assinalado (2) em 1925.

Desejo, agora, occupar-me de uma outra raça de *B. neuwiedii*, representada por varios exemplares que o Instituto Butantan tem ultimamente conseguido receber do extremo leste do Estado do Rio de Janeiro, na região proxima do Cabo São Thomé. Esses exemplares distinguem-se facilmente dos representantes das outras raças occorrentes no Brasil por seu systema de manchas bem caracteristico, tanto que, no momento de serem retirados vivos das caixas em que são remetidos, têm sido logo reconhecidos e trazidos para estudos no laboratorio.

***Bothrops neuwiedii fluminensis*, subsp. n.**

*Diagnose* — Os individuos desta subespecie caracterizam-se facilmente em vida pelo seu colorido de fundo pardo-chocolate, mais claro dos lados, com ocellos paravertebraes negros tarjados de branco e manchas transversaes alternadas ou oppostas (confluentes sobre a linha vertebral), sub-trianguulares, castanho-negras tarjadas de branco; região paraventral com manchas negras sub-douradas; ventre bem manchado de castanho anegrado, manchas lateraes maiores, cabeça com diversas manchas negras tambem tarjadas de branco, sendo uma sub-redonda na região preorbitaria, duas longitudinaes na região occipital-nuchal (Fig. 1).

Nesta subespecie o dimorphismo sexual é representado pela seguinte formula baseada nos exemplares actualmente existentes:

♂ ♂ — E. dors. 22-25; V. 166-168; Sbc. 44-48.

♀ ♀ — E. dors. 25 ; V. 169-173; Sbc. 39-44,  
conforme se verifica pela seguinte

Lista de exemplares de *B. neuwiedii fluminensis*, subsp. n.

N.º	Procedencia	Sexo	Sp. L.	Dors.	V.	Sb. C.	Observações
6154 . . .	Colomins, Rio	♀	8/9	25	173	41 p.	Fig. 1, <i>ex-vivo</i>
6402 . . .	" "	♀	8	25	169	39 p.	
7424 . . .	" "	♂	8	23	166	46 p.	
7602 . . .	" "	♂	8	25	166	44 p.	
7603 . . .	" "	♂	8	23	168	46 p.	
7604 . . .	" "	♂	8	22	168	48 p.	
7806 . . .	Barcellos, Rio	♀	8	25	171	44 p.	Viva. <i>Typo</i>

Como se vê, os exemplares procedem de Colomins e de Barcellos, a leste de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

#### ABSTRACT

A new race of *Bothrops neuwiedii* is described (*B. neuwiedii fluminensis*) as based on 7 specimens received from the easternmost section of the state of Rio de Janeiro, near the São Thomé Cape. This is the 10th race into which this species has thus far been divided.

#### BIBLIOGRAPHIA

1. Amaral, A. do — Bull. Antivenin Inst. America IV(3); 65-67. 1 fig. 1930.
2. Amaral, A. do — Harvard Inst. Trop. Biol. & Med. Contrib. II:56-62. Tabs. XIII — XVI. 1925.

(Trabalho da Secção de Ophiologia e Zoologia Médica do Instituto Butantan, dezembro de 1932).