

NOTAS OFIOLOGICAS

4. Cinco especies novas de serpentes colombianas do genero *Atractus* WAGLER

POR

ALCIDES PRADO

Foram reunidas aqui, para publicação em nota previa, cinco especies novas de ofidios do genero *Atractus*. Pertencem elas a dois lotes que vieram da Colombia, respectivamente, em 1938 e 1939.

Alem dessas, outras pertencentes ao mesmo genero foram determinadas, como sejam as seguintes: *Atractus crassicaudatus* (D. & B.), *Atractus melas* BOULENGER e *Atractus bocourti* BOULENGER, esta ultima da fauna do Perú e Equador.

O revmo. irmão Niceforo Maria, do Instituto de La Salle, de Bogotá, que tão brilhantemente se ocupa do assunto em seu país, continua a ser o valioso colaborador da Secção especializada do Instituto Butantan, fato que é atestado pela presente remessa do importante material.

Atractus arangoi, sp. n.

(Fig. 1)

♀ — Focinho arredondado. Rostral pequena, pouco mais larga do que alta, visível de cima; internasais muito pequenas; prefrontais mais longas do que largas; frontal mais longa do que larga, tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal tres vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a postero-superior longa, atinge a extremidade da parietal respectiva; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par. Escamas lisas, luzentes, sem depressões apiculares, em 17. Ventrals 159; anal inteira; subcaudais 25/25 + n. Pardo-palida em cima, com manchas pardo-

escuras areoladas de claro, irregulares, em bastonetes, geralmente em uma unica serie sobre o dorso; cabeça pardo-escura; garganta e ventre branco-amarelados.

Comprimento total 395 mm.; cauda 52 mm.

Holotipo, adulto ♀, sob o No. 136, na coleção do Museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Colombia.

Afim de *Atractus major* BOULENGER, da qual se distingue por possuir numero menor de ventrais e, provavelmente, de subcaudais; pelo colorido geral e pelo comprimento total, que é muito menor, pois *A. major* mede cerca de 700 mm.

Esta especie é dedicada à memoria do grande cientista colombiano Posada Arango.

Atractus indistinctus, sp. n.

(Fig. 2)

♀ — Cabeça curta; focinho arredondado. Rostral pequena, mais larga do que alta, pouco visivel de cima; internasais pequenas; prefrontais tão longas quanto largas; frontal mais larga do que longa, tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal duas vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a postero-superior, alcança a extremidade da parietal respectiva; 1 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par. Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 17. Ventrais 170; anal inteira; subcaudais 35/35 + 1. Pardo-avermelhada, com um indistinto traço negro sobre a linha vertebral, o qual partindo da nuca termina quasi na extremidade da cauda; dois outros da mesma côr nos flancos; cabeça negra; labios, garganta e partes inferiores, branco-amarelados, porem esta ultima irregularmente manchada de pardo.

Comprimento total 444 mm.; cauda 48 mm.

Holotipo, adulto ♀, sob o No. 166, na coleção do Museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Ocaña, departamento norte de Santander.

Proximo a *Atractus maculatus* (GÜNTHER) e a *Atractus obtusirostris* WERNER, distingue-se daquela pelo maior numero das ventrais e das subcaudais e pelo colorido, desta pelo maior numero das ventrais e menor das subcaudais e pelo colorido.

Atractus longimaculatus, sp. n.

(Fig. 3)

♂ — Focinho arredondado. Rostral pequena, pouco mais larga do que alta, visível de cima; internasais muito pequenas, pouco mais largas do que longas; prefrontais tão longas quanto largas; frontal pouco mais larga do que longa, quase tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal duas vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a postero-superior atinge a extremidade da parietal respectiva; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par. Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 17. Ventrals 166; anal inteira; sub-caudais 21/21 + 1. Castanho-clara, com tres series de manchas negras: 1.^a sobre a linha vertebral, em traço continuo no terço anterior do corpo, e sob a forma de pontilhados largos nos dois terços restantes; 2.^a e 3.^a sobre cada um dos flancos, sob a forma de pontilhados finos. Duas faixas negras dos lados da cabeça: uma que vai do angulo posterior do olho à comissura dos labios, outra, paralela a essa, caminha ao nivel das temporas. Finalmente, um desenho negro em V, de vertice posterior, sobre as parietais, e duas manchas negras: uma sobre a frontal e outra sobre a nuca. Partes inferiores amarelas, marchetadas de negro.

Comprimento total 372 mm.; cauda 21 mm.

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 170, na coleção do Museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Região do Quindío.

Afim de *Atractus maculatus* (GÜNTHER), da qual se distingue pela frenal, que é menos longa e pelo colorido geral.

Atractus manizalesensis, sp. n.

(Fig. 4)

♂ — Focinho arredondado. Rostral pouco mais larga do que alta, não muito visível de cima; internasais pequenas; prefrontais tão longas quanto largas; frontal tão larga quanto longa, quase tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal duas vezes e meia tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a postero-superior atinge a extremidade da parietal respectiva; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 4 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par. Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 15. Ventrals 152; anal inteira;

subcaudais 20/20 + 1. Castanho em cima, com duas series de manchas negras, guarnecidas de claro, paravertebrais; cabeça manchada de negro; labios, garganta e ventre branco-amarelados, sendo o ultimo salpicado de pardo.

Comprimento total 370 mm.; cauda 31 mm.

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 172, na coleção do Museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

E' afim de *Atractus punctiventris* AMARAL, que possui as seguintes características: frenal tres vezes tão longa quanto alta; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva. Tambem o colorido e dimensões de *A. punctiventris* lhe são diferentes. *Atractus reticulatus* BOULENGER, que lhe é tambem afim, assim se apresenta: frontal pouco mais larga do que longa; frenal duas vezes tão longa quanto alta. Colorido de *A. reticulatus* difere bastante da especie em apreço.

Paratipo, jovem ♀, sob o No. 157, na mesma coleção, procedente de Vila Maria (Manizales).

E. 15; V. 154; A. 1; C. 18/18 + 1.

Spl. 7 (3.^a e 4.^a junto ao olho). Infl. 6 (3 em contacto com a mental respectiva); T. 1 + 2.

Colorido perfeitamente identico ao da especie tipo.

Atractus colombianus. sp. n.

(Fig. 5)

♂ — Focinho obtuso. Rostral pequena, mais larga do que alta, visivel de cima; internasais muito pequenas; prefrontais tão longas quanto largas; frontal tão larga quanto longa, tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal duas vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a postero-superior não vai alem do meio da parietal respectiva; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par. Escamas lisas, brilhantes sem depressões apiculares, em 17. Ventrals 149; anal inteira; subcaudais 29/29 + 1. Pardo-olivacea em cima, com faixa negra vertebral, a qual guardando a largura de uma escama, vai da parte nuczal à extremidade caudal; escamas, em geral, tarjadas de negro; nos flancos, uma linha clara, a qual envolve as extremidades das ventrais e a fileira contigua das escamas dorsais; ventre inteiramente negro, luzente.

Comprimento total 362 mm.; cauda 42 mm.

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 174, na coleção do Museu do Instituto de La Salle.

Procedencia: Chocontá.

Proxima a *Atractus fuhrmanni* PERACCA, da qual se distingue pelo menor numero das ventrais e maior das subcaudais. Quanto ao colorido, *A. fuhrmanni* não possui nem a faixa negra vertebral, nem a linha clara dos flancos.

Paratipo, jovem ♂, sob o No. 155 na mesma coleção. Procedencia: a mesma da especie tipo.

E. 17; V. 144; A. 1; C. 29/29 + 1.

Spl. 7 (3.^a e 4.^a junto ao olho). Infl. 3 em contacto

com a mental respectiva; T. 1 + 2.

Colorido identico, apenas o ventre se apresenta mesclado de branco.

(Trabalho da Secção de Ofiologia e Zoologia Medica, entregue para publicação em outubro de 1939. Dado à publicidade em Janeiro de 1940).



Fig. 1
Atractus arangoi, sp. n.




Fig. 2
Atractus indistinctus, sp. n.





Fig. 3
Atractus longimaculatus, sp. n.






Fig. 4

Atractus manizalesensis, sp. n.




Fig. 5

Atractus colombianus, sp. n.

