

## NOTAS OFIOLOGICAS

### 6. Uma nova especie de Colubrideo aglifo da Colombia

POR

ALCIDES PRADO

A especie que ora descrevo como nova, *Dipsas niceforoi*, sp. n., possui como as demais do genero *Dipsas*, entre outros caracteres, dois ou mais pares de infralabiais em contacto, na linha mediana, por trás da sinfisial.

Muitos autores separam as especies de *Dipsas* das de *Sibynomorphus*, pela ausencia de dentes pterigoideos naquelas e presença dos mesmos nestas ultimas.

Assim é que Mocquard e Amaral incluem no genero *Dipsas*, as especies *Dipsas albifrons* (SAUVAGE) e *Dipsas variegata* (D. & B.), outrora colocadas no genero *Sibynomorphus* (= *Leptognathus*).

Parker, examinando especimes do Museu Britanico, confirmou a ausencia de dentes pterigoideos em *Dipsas albifrons*, enquanto que, em dois exemplares de *Dipsas variegata*, um não os possuía e outro os tinha em numero de tres para cada osso.

Refere-se à sua *Dipsas trinitatis*, que os tem em numero de dois ou tres para cada pterigoideo, e à de Amaral, *Dipsas neivai*, que os não possui, sendo ambas muito proximas a *Dipsas variegata*.

Conclue dizendo que a presença ou a ausencia de dentes pterigoideos não servirá para estabelecer distinção entre as especies de *Dipsas* e *Sibynomorphus*, mostrando com *Dipsas variegata*, que ha uma gradação entre os dois generos.

O proprio Amaral a isso não é infenso, quando afirma que, caso se confirme a observação de Parker, o genero *Sibynomorphus* deverá passar para a sinonimia de *Dipsas* que é anterior a ele.

No presente caso, tratando-se de *Dipsas niceforoi*, sp. n., os dentes pterigoideos existem até em numero relativamente elevado, como se poderá constatar da descrição que se segue.

*Dipsas niceforoi*, sp. n.

♀ — Corpo fortemente comprimido. Cabeça distinta do pescoço. Dentes pterigoideos 10/10. Olho grande; pupila eliptica-vertical.

Rostral pouco mais larga do que alta, difficilmente visivel de cima; nasal semi-dividida; internasais mais largas do que longas, quasi um terço do comprimento das prefrontais; frontal pouco mais larga do que longa, quasi tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal pouco mais alta do que longa, junto ao olho; supraocular larga; preocular pequena, acima da frenal; 2/3 postoculares; temporais 2 + 3; 8 supralabiais, 4.<sup>a</sup> e 5.<sup>a</sup> junto ao olho, 2 ultimas mais longas; 11 infralabiais, 2 primeiros pares em contacto, na linha mediana, por trás da sinfisial; 3 pares de mentais. Escamas lisas, sem depressões apiculares, as vertebrais moderadamente alargadas, em 15. Ventrals 176; anal inteira. Subcaudais 73/73 + 1.

Pardo-palida em cima, com largas faixas pardo-escuras, e com algumas escamas guarnecidas de escuro; cabeça pardo-escura, com uma tenue faixa palida sobre a nuca; garganta e ventre levemente mesclados de pardo, porém, este ultimo, em sua porção anterior é atravessado pelas faixas pardo-escuras do dorso.

Comprimento total 256 mm.; cauda 56 mm..

Holotipo, jovem ♀, sob o No. 165, na coleção do museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Quindío, na Cordilheira Central, Colombia.

Colecionado pelo revmo. irmão Nicéforo Maria, em 1939, a quem o nome da especie é dedicado.

Afim de *Dipsas trinitatis* PARKER. Esta, ao contrario de *Dipsas niceforoi*, sp. n., possui: frontal tão longa quanto larga, 2 pares de mentais, maior numero de ventrais e subcaudais.

Seu colorido geral tambem é diferente.

Não se confundirá com *Dipsas pratti* (BOULENGER), que ocorre na Colombia, porque esta, além de apresentar no colorido desenhos diversos, tem as seguintes características, que a separam de *Dipsas niceforoi*, sp. n.: rostral tão alta quanto larga, visivel de cima; internasais com cerca de metade de comprimento das prefrontais; frontal tão longa quanto larga; frenal mais longa do que alta; 2 pares de mentais.

## RESUMO

Refere-se este trabalho, além de comentarios em torno da posição em sistematica dos generos *Dipsas* e *Sibynomorphus* (= *Leptognathus*), à descrição de *Dipsas niceforoi*, sp. n., que ocorre na Colombia, sendo a mesma afim de *Dipsas trinitatis* PARKER.

## ABSTRACT



This work deals in first place with the systematic position of the genera *Dipsas* and *Sibynomorphus* (= *Leptognathus*), and in second place with the description of *Dipsas niceforoi*, n. sp., which occurs in Columbia, being similar to *Dipsas trinitatis* PARKER.

## BIBLIOGRAFIA

- Duméril & Bibron* — Erp. Gen. 7:477.1854.  
*Boulenger, G. A.* — Cat. Sn. Brit. Mus. 3:447.1896.  
*Boulenger, G. A.* — Ann. & Mag. Nat. Hist. (6)20:523.1897.  
*Macquard* — Miss. Sc. Mex. 3:896.1909.  
*Amaral, A. do* — Arch. Mus. Nac. 26:108.1926.  
*Parker, H. W.* — Ann. & Mag. Nat. Hist. (9)18:205.1926.  
*Amaral, A. do* — Mem. Inst. Butantan 10:127.1935/36.

(Trabalho da Secção de Ofiologia e Zoologia Médica do Instituto Butantan, entregue para publicação em maio de 1940. Dado à publicidade em agosto de 1940).





*Dipsas maceforos*, sp. n.

