

NOTAS OFIOLOGICAS

8. Dois novos *Atractus* da Colombia

POR

ALCIDES PRADO

Entre os ofidios remetidos ha pouco da Colombia pelo revmo. irmão Nicéforo Maria, dois, pertencentes ao genero *Atractus*, me pareceram novos. Os demais foram assim determinados:

Helminthophis anops COPE, *Helminthophis praecularis* AMARAL, *Eudryas boddaertii* (SENTZEN), *Lygophis taeniurus albiventris* (JAN), *Lygophis taeniurus bipraeocularis* (BOULENGER), *Urotheca lateristriga* BERTHOLD, *Atractus badius* (BOIE), *Atractus longimaculatus* PRADO, *Atractus manizalesensis* PRADO, *Sibynomorphus mikanii oreas* (COPE) e *Pseudoboa cloelia* (DAUDIN).

Atractus vertebrolineatus, sp. n.

♂ — Focinho arredondado. Rostral mais larga do que alta, pouco visível de cima; internasais pequenas, tão largas quanto longas; prefrontais tão largas quanto longas; frontal tão larga quanto longa, quasi tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, muito mais curta do que as parietais; frenal cerca de 2 vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par.

Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 17. Ventrals 159; anal inteira; subcaudais 46/46 + 1.

Castanho-parda em cima, com uma lista cinza-escura sobre a linha vertebral, a qual é ladeada por pontilhados negros; duas faixas largas da mesma cor, de ambos os lados, nos flancos; cabeça enegrecida; labios e garganta branco-

amarelados; ventre branco-amarelado, manchado de pardo, e com sua porção caudal fortemente manchada da mesma côr, ao centro.

Comprimento total 296 mm.; cauda 48 mm..

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 184, na coleção do museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Ocaña, ao norte de Bucaramanga, Colombia.

É uma forma de *Atractus* com escamas dorsais em 17, e onde também se inclue o *Atractus crassicaudatus* (D. & B.).

É proxima a *Atractus loveridgei* AMARAL, que tem como diferenças específicas as seguintes: rostral tão larga quanto alta, prefrontais mais longas do que largas, frenal quasi 3 vezes tão longa quanto alta, subcaudais 18 pares, e côr pardo-oliva em cima com 6 linhas negras longitudinais.

Atractus biseriatus, sp.n.

♂ — Focinho obtuso. Rostral pequena, mais larga do que alta, pouco visível de cima; internasais também pequenas, tão largas quanto longas; prefrontais grandes, tão largas quanto longas; frontal pouco mais longa do que larga, tão longa quanto sua distancia da extremidade do focinho, mais curta do que as parietais; frenal cerca de 2 vezes tão longa quanto larga; 2 postoculares; temporais 1 + 2; 7 supralabiais, 3.^a e 4.^a junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um unico par.

Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 15. Ventrals 148; anal inteira; subcaudais 18/18 + 1.

Pardo-escura em cima, com duas series de manchas claras paravertebrais, às vezes confluentes; cabeça da côr geral, desmaiada nas temporas e focinho; ventre branco-amarelado, salpicado de pardo, e com sua porção caudal fortemente manchada dessa côr.

Comprimento total 237 mm.; cauda 19 mm..

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 187, na coleção do museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedencia: Manizales, Colombia.

Esta especie pertence ao grupo de *Atractus* com escamas dorsais em 15. Entre as formas colombianas, ela é afim de *Atractus reticulatus* BOULENGER, *Atractus niceforoi* AMARAL, *Atractus punctiventris* AMARAL, e *Atractus manizalesensis* PRADO, que oferecem os seguintes caracteres distintivos:

Atractus reticulatus: focinho arredondado, frontal pouco mais larga do que longa, 4 infralabiais em contacto com a mental respectiva côr pardo-palida com escamas bordadas de pardo-negro;

Atractus niceforoi: frontal tão larga quanto longa, frenal 2 vezes e meia tão longa quanto alta, côr plumbeo-cinza com as bordas das escamas paraventrals claras;

Atractus punctiventris: frontal tão larga quanto longa, frenal 3 vezes tão longa quanto alta, côr castanho-clara com uma serie paravertebral de manchas negras tarjadas de claro, e ventre esbranquiçado com uma estria negra mediana;

Atractus manizalesensis: frontal tão larga quanto longa, frenal 2 vezes e meia tão longa quanto alta, côr castanha em cima, com duas series de manchas negras paravertebrals orladas de claro, ventre branco-amarelado apenas salpicado de pardo.

RESUMO

São aqui descritas duas formas novas de *Atractus*: *Atractus vertebrolineatus*, sp.n. e *Atractus biseriatus*, sp.n., a primeira afim de *Atractus loveridgei* AMARAL, e a segunda de *Atractus reticulatus* BOULENGER, *Atractus niceforoi* AMARAL, *Atractus punctiventris* AMARAL, e *Atractus manizalesensis* PRADO.


ABSTRACT

A description is given of two new species of *Atractus*: *Atractus vertebrolineatus*, n.sp. and *Atractus biseriatus*, n.sp., the former being similar to *Atractus loveridgei* AMARAL, and the latter to *Atractus reticulatus* BOULENGER, *Atractus niceforoi* AMARAL, *Atractus punctiventris* AMARAL, and *Atractus manizalesensis* PRADO.

BIBLIOGRAFIA

- Boulenger, G. A.* — Cat. Sn. Brit. Mus. 2:300.1894.
Amaral, A. do — Bull. Antiv. Inst. America 4:27.1930/31.
Amaral, A. do — Mem. Inst. Butantan 7:105.1932.
Prado, A. — Mem. Inst. Butantan 31:15.1939.

(Trabalho da Secção de Ofiologia e Zoologia Medica do Instituto Butantan, entregue para publicação em julho de 1940. Dado à publicidade em agosto de 1940).



Atractus vertebrolineatus, sp. n.



Atractus biseriatus, sp. n.

