

## NOTAS OFIOLÓGICAS

### 12. Considerações em torno de dois *Atractus* da Colômbia, com a descrição de uma nova espécie

POR

ALCIDES PRADO

Duas espécies do gênero *Atractus*, dentre as inúmeras descritas para a Colômbia, me pareceram bastante firmes, quer quanto à sua distribuição geográfica, quer quanto ao conjunto de seus caracteres específicos.

São elas as seguintes: *Atractus loveridgei* AMARAL e *Atractus colombianus* PRADO, a primeira disseminada na área que fica entre a Cordilheira Central e a Cordilheira Oriental daquele país e que coincide com o departamento de Cundinamarca; a segunda distribuída mais para o norte, da Cordilheira Ocidental à Cordilheira Oriental, dentro dos departamentos de Antioquia e Boyacá, respectivamente.

O colorido, que nas duas espécies tem importante valor para o seu reconhecimento à primeira vista, é o seguinte:

*Atractus loveridgei* — pardo-olivácea em cima com seis linhas negras longitudinais, em que a primeira é interrompida e corre ao longo da segunda fileira de escamas, a segunda ao longo da quarta e quinta fileira e a terceira ao longo da sétima e oitava de cada lado; ventre róseo-amarelado, manchado de negro dos lados.

*Atractus colombianus* — pardo-olivácea em cima, com uma faixa negra vertebral, a qual, guardando a largura de uma escama, vai da parte nugal à extremidade caudal; ponta da cauda enegrecida; escamas em geral tarjadas de negro; nos flancos u'a linha clara, a qual envolve as extremidades das ventrais e a fileira contígua das escamas dorsais; ventre inteiramente negro, luzente ou mesclado de branco.



Os quadros abaixo, pelo exame de alguns exemplares das aludidas espécies dão conta do conjunto de caracteres pertencentes a cada uma:

*Atractus loveridgei* AMARAL

Espécimes Nos.	Procedência	Sexo	E.	V.	A.	Sub.	Labiais		Oculares		Comprimento em mm.	
							Su- pra	Infra J. M.	Pre	Post	Total	Cauda
45, M. C. Z.	Jericó D, A. ...	♀	17	161	1	18/18	7	4	ausente	2	360	27
10128, I. B. ..	La Uvita, D. B. ..	♂	17	157	1	—	7	4	«	2	292	35
10129, I. B. ..	La Uvita, D. B. ..	♂	17	160	1	25/25	7	4	»	2	394	42
195, I. L. S. ..	Jericó, D. A. ...	♂	17	164	1	21/21	7	4	»	2	308	31
10130, I. B. ..	La Uvita, D. B. ..	♂	12	165	1	23/23	7	4	»	2	407	43
8909, I. B. ..	Jericó, D. A. ...	♀	17	168	1	16/16	7	4	»	2	504	35
8917, I. B. ..	San Pedro, D. B. ..	♀	17	167	1	15/15	7	4	»	2	386	26
7202, I. B. ..	Jericó, D. A. ...	♂	17	149	1	27/27	7	4	»	2	325	41
8594, I. B. ..	Jericó, D. A. ...	♀	17	169	1	17/17	7	4	»	2	273	20
8908, I. B. ..	Jericó, D. A. ...	♂	17	155	1	25/25	7	4	»	2	310	30
9038, I. B. ..	—	—	17	160	1	37/37	7	3	»	2	—	—
10176, I. B. ..	La Uvita, D. B. ..	♂	17	153	1	29/29	7	4	«	2	224	24
202, I. L. S. ..	La Uvita, D. B. ..	♀	17	162	1	22/22	7	4	»	2	346	36
10177, I. B. ..	La Uvita, D. B. ..	♂	17	151	1	26/26	7	4	»	2	320	39

*Atractus colombianus* PRADO

Espécimes Nos.	Procedência	Sexo	L.	V.	A.	Sub.	Labiais		Oculares		Colorido		Comprimento em mm.	
							Su- pra	Infra J. M.	Pre-	Post	Dor- so	Ven- tre	Total	Cau- da
174, I. L. S.	Chocontá, D. C. ..	♂	17	149	1	29/29	7	3	ausente	2	normal	negro	362	42
155, I. L. S.	Chocontá, D. C. ..	♂	17	144	1	29/29	7	3	»	2	»	mes- clado	—	—
19127, I. B.	Congua, D. C. ...	♂	17	145	1	27/27	7	3	»	2	»	»	317	41
200, I. L. S.	La Union, D. C. ..	♂	17	153	1	27/27	7	3	»	2	»	»	317	36

Das mãos do revmo. Irmão Nicéforo Maria recebi para exame um exemplar que, pelos caracteres específicos apresentados, levou-me a considerar o aparecimento de uma nova espécie para a Colômbia, dentre os da série com escamas dorsais em 17, conforme a descrição que se segue:



*Atractus variegatus*, sp. n.

♂ — Cabeça curta; focinho arredondado. Rostral mais larga do que alta, apenas visível de cima; internasais moderadas, tão largas quanto longas, metade do comprimento das prefrontais; prefontais mais largas do que longas; frontal tão larga quanto longa, tão longa quanto a sua distância da extremidade do focinho, mais curta do que as parietais; loreal duas vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; temporais 1 + 2, a súpero-posterior atinge a extremidade da parietal respectiva; 6 supralabiais, 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> junto ao olho; 4 infralabiais em contacto com a mental respectiva de um único par.

Escamas lisas, sem depressões apiculares, em 17. Ventrals 157; anal inteira; subcaudais 27/27.

Castanho-pardo-avermelhada, com manchas irregulares, pardo-escuras, sobre o dorso; ao centro, quadrangulares, em duas séries; lateralmente, numerosas estrias da mesma cor; cabeça variegada ou mesclada de pardo-escuro; ventre quasi inteiramente plúmbeo, brilhante.

Comprimento total 345 mms.; cauda 45 mms..

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 201, na coleção do museu do Instituto de La Salle, Bogotá.

Procedência: La Uvita, departamento de Boyacá.

Afim de *Atractus loveridgei* AMARAL. Esta distingue-se de *Atractus variegatus*, sp. n., pelo número das supralabiais que é de 7 ao invés de 6; ainda esta apresenta os seguintes caracteres distintivos em confronto com a nova espécie em estudo: rostral tão larga quanto alta; internasais pequenas; prefrontais mais longas do que largas; loreal quasi tres vezes mais longa do que alta; cor olivá-pardo, com 6 linhas negras longitudinais sobre o dorso.

## RESUMO

Nestas notas são estudadas o conjunto de caracteres específicos e a distribuição geográfica das espécies colombianas, *Atractus loveridgei* AMARAL e *Atractus colombianus* PRADO, o que prova a perfeita validade de ambas.

Ainda descreve-se a espécie *Atractus variegatus*, sp. n., procedente de La Uvita, departamento de Boyacá.

## ABSTRACT

These papers study the assembly of specific characteristics and the geographic distribution of the Colombian species, *Atractus loveridgei* AMARAL and *Atractus colombianus* PRADO, proving the perfect validity of both.



Furthermore, the species *Atractus variegatus*, n. sp., provenient from La Uvita, Departament of Boyacá, is described.

#### BIBLIOGRAFIA

Amaral, A. do — Bull. Antiv. Inst. America 4:28.1930/31.

Prado, A. — Mem. Inst. Butantan 14:6.1940.

(Trabalho da Secção de Ofiologia e Zoologia Médica do Instituto Butantan. Entregue para publicação em junho de 1941 e dado à publicidade em janeiro de 1942.)





*Atractus variegatus*, sp. n.



