

## NOTAS OFIOLÓGICAS

### 19. *Atractus* da Colômbia, com a redescrição de três novas espécies.

POR

ALCIDES PRADO

(Do Laboratório de Ofiologia e Zoologia Médica do Instituto Butantan,  
São Paulo, Brasil)

De um lote de serpentes, enviado da Colômbia, em 1943, pelo revmo. Hermano Daniel, do Colégio de San José, de Medellin, duas espécies se destacaram, sendo as mesmas aqui redescritas. No mesmo ano, de outro lote, remetido pelo revmo. Hermano Niceforo Maria, do Instituto de La Salle, de Bogotá, foi possível descrever-se mais uma como nova, que agora é aqui também redescrita.

#### *Atractus andinus* PRADO

♀ — Focinho arredondado. Rostral mais larga do que alta, pouco visível de cima; internasais pequenas, tão largas quanto longas; prefrontais grandes, também tão largas quanto longas; frontal mais larga do que longa, mais curta do que sua distância da extremidade do focinho; loreal 2 vezes tão longa quanto alta; 2 postoculares; 1 + 2 temporais; 7 supralabiais, com 3ª e 4ª junto ao olho; 3 infralabiais em contacto com a mental. Escamas lisas, sem fossetas apiculares, em 17; ventrais 174; anal inteira; subcaudais 37/37.

Pardacenta em cima, com u'a linha negra vertebral, orlada de manchas arredondadas, da mesma cor, em toda extensão, paravertebrais; pontilhados negros paraventrals, formando como que uma listra longitudinal, de cada lado; cabeça enegrecida, porém desmaiada nas têmporas; lábios e partes inferiores manchados de pardo-negro.

Comprimento total 287 mm; cauda 37 mm.

Holotipo, adulto ♀, sob o No. 231, na coleção do Colégio de San José, de Medellin, Colômbia.

Procedência: Andes.

Afim de *Atractus maculatus* (GÜNTHER), do qual se distingue pelo número de ventrais e subcaudais e pelo colorido geral.



*Atractus sanguineus* PRADO

♂ — Focinho arredondado. Rostral cêrca de 2 vêzes tão larga quanto alta, pouco visível de cima; internasais pequenas, tão largas quanto longas; prefrontais grandes, também tão largas quanto longas; frontal pouco mais larga do que longa, mais curta do que sua distância da extremidade do focinho; loreal cêrca de 3 vêzes tão longa quanto alta; 2 postoculares; 1 + 2 temporais; 7 supralabiais, com 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> junto ao ôlho; 3 infralabiais em contacto com a mental; Escamas lisas, sem fossetas apiculares, em 17; ventrais 179; anal inteira; subcaudais 43/43.

Vermelho-sanguínea em cima, onde sôbre a linha mediana corre um traço negro, ladeado em toda extensão por manchas arredondadas da mesma côr, paravertebrais; cabeça enegrecida; partes inferiores branco-amareladas, salpicadas de pardo-negro.

Comprimento total 424 mm; cauda 58 mm.

Holotipo, adulto ♂, sob o No. 232, na coleção do Colégio de San José, de Medellin, Colômbia.

Procedência: Yarumal (N. de Medellin).

Próxima à anterior, da qual se separa por um número ainda mais elevado de ventrais e subcaudais, pelo alongamento da loreal e pelo colorido geral.

*Atractus wagleri* PRADO

♀ — Focinho arredondado. Rostral pouco mais larga do que alta, apenas visível de cima; internasais muito pequenas, tão largas quanto longas; prefrontais muito grandes, tão largas quanto longas; frontal tão larga quanto longa, pouco mais longa do que sua distância da extremidade do focinho; loreal 2 vêzes tão longa quanto alta; 2 postoculares; 1 + 2 temporais; 7 supralabiais, com a 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> junto ao ôlho; 3 infralabiais em contacto com a mental. Escamas lisas, sem fossetas apiculares em 17-17-17; ventrais 174; anal inteira; subcaudais 43/43.

Avermelhada em cima, com faixas transversais e irregulares sôbre o dorso, flanqueadas por outras menores, alternadas; cabeça enegrecida; ventre pardo-negro.

Comprimento total 411 mm; cauda 56 mm.

Holotipo, adulto ♀, sob o No. 228, no museu do Instituto de La Salle, de Bogotá, Colômbia.

Procedência: Humbo (Boyacá).

Afim de *Atractus sanguineus*, do qual se distingue pelos seguintes caracteres: pela rostral que é pouco mais larga do que alta e não 2 vêzes tão larga quanto



F. PRADO JR., A. TABORDA & L. C. TABORDA — Ensaio terapêuticos com

alta; pela frontal que é tão larga quanto longa e não pouco mais larga do que longa; pela loreal que é 2 vezes mais longa do que alta e não três vezes; e, finalmente, pelas variações de colorido.

O nome desta espécie foi dedicado à memória de JEAN WAGLER, conhecido naturalista, e criador do gênero *Atractus*.

### RESUMO

Redescrevem-se os *Atractus andinus* PRADO e *Atractus sanguineus* PRADO, procedentes, respectivamente, de Andes e Yarumal, na Colômbia, e posteriormente *Atractus wagleri* PRADO, próxima à segunda daquelas, e proveniente de Humbo (Boyacá), no mesmo país.

### ABSTRACT

*Atractus andinus* PRADO and *Atractus sanguineus* PRADO, provenient respectively from the Andes and Yarumal, in Colombia, are redescribed, followed by *Atractus wagleri* PRADO, which resembles the latter and came from Humbo (Boyacá), in the same country.

### BIBLIOGRAFIA

- Boulenger, G. A. (1894). Cat. Sn. Brit. Mus., 2:306.  
Prado, A. (1944). Ciência (México), 5(4-5):111.  
Prado, A. (1945). Ciência (México), 6(2):61.

(Recebido para publicação em 6 de março de 1944).







*Atractus andinus* PRADO



*Atractus sanguineus* PRADO



*Atractus teapleri* PRADO



